

Questão: 51

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1709943														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

A dose inicial utilizada de sulfato de magnésio nos casos de eclampsia ou pré-eclâmpsia, é de 4g EV e não 4mg, como constou, equivocadamente, no enunciado da questão. Apesar de o midazolam atravessar a barreira placentária e poder causar alterações no feto, o quadro grave descrito com arreflexia, fraqueza, dificuldade respiratória, hipotonia muscular e bradicardia no recém-nato, apresentado pelo feto a termo, só ocorre com dose superior a que foi utilizada na mãe, no caso em questão.

Referências bibliográficas: Miller`s 8th Ed, 2015, volume 2, chapter 77, Anesthesia for Obstetrics, página.: 2348;

Tratado de Anestesiologia SAESP 7^a Ed, 2011, volume 2, capítulo 27, Anestesia e Analgesia em Obstetrícia página: 2331 - tabelas 151.6 e 151.7

- Situação da questão: **anulada.**

Questão: 54

- Inscrições dos candidatos que interpuseram recurso:

1700130	1710378	1701735												
---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Parecer da Banca Examinadora:

A utilização do sinal, convencionalmente e tradicionalmente, utilizado com o significado de “menor” tornou a questão confusa. A ordem correta seria, em ordem de MAIOR ABSORÇÃO PARA MENOR ABSORÇÃO, a seguinte: intercostal ⇒ caudal ⇒ peridural ⇒ plexo braquial ⇒ tópica de vias aéreas (tecido subcutâneo).

Referências bibliográficas: Miller`s 8th Ed, 2015, volume 1, chapter 36, Local Anesthetics, página: 1046.

- Situação da questão: **anulada.**